



Cliniques universitaires
SAINT-LUC
UCL BRUXELLES

DRI  **Un hôpital
pour la Vie**
Dental Regenerative & Innovative Materials

 **COVID-19**

URGENCES DENTAIRES
prises en charges
aux Cliniques Universitaires St-Luc

Note importante

! Surcharge et concentration dans les centres hospitaliers !

Nous tenons à rappeler qu'il est prioritaire de minimiser la concentration des patients dans les centres hospitaliers, dont les ressources limitées actuellement doivent être essentiellement destinées au corps médical afin de gérer le plus efficacement possible l'épidémie de COVID-19

Le présent document a été partagé pour aider chaque praticien, nullement pour favoriser un afflux massif de patients vers les centres hospitaliers, ce qui serait **hautement dommageable pour la population !**

Merci donc à tous les praticiens privés de faire le nécessaire en ce sens dans leurs régions respectives pour gérer les urgences dentaires

L'efficacité de la gestion de cette crise dépend de la bonne volonté et du discernement de chacun.



Cliniques universitaires

SAINT-LUC

UCL BRUXELLES



Un hôpital
pour la Vie

 **COVID-19**

URGENCES DENTAIRES

prises en charges

aux Cliniques Universitaires St-Luc

Généralités

Vu les risques de transmission inhérents à notre discipline (patient-praticien et patient-patient), les consultations dentaires sont limitées au strict minimum, c'est-à-dire aux consultations **urgentes**

Toutes les consultations dentaires **urgentes** passent par un **tri téléphonique (voir arbre décisionnel)** avec les objectifs suivants:

1. Etablir le **diagnostic le plus probable** (en l'absence de radios et examen clinique)
2. Déterminer si un traitement médicamenteux peut soulager le patient, auquel cas le mettre en place via une *prescription électronique*

Réaliser un **suivi téléphonique** à 24-48h pour vérifier l'amélioration des symptômes

En l'**absence d'efficacité du traitement médicamenteux** ou **si l'acte local est indispensable d'emblée**, *recevoir le patient en consultation** pour affiner le diagnostic et *si indiqué* réaliser l'**acte local** (avec les précautions mentionnées plus loin)

***Status COVID-19**

Tout **patient** testé positif au COVID-19 ou présentant les symptômes associés à la maladie (fièvre, toux sèche, difficultés respiratoires...) ne sera pris en charge qu'en cas d'extrême nécessité et uniquement dans la zone COVID-19 des Cliniques Universitaires Saint-Luc



Cliniques universitaires
SAINT-LUC
UCL BRUXELLES

DRI *Un hôpital pour la Vie*
Dental Regenerative & Innovative Materials

 **COVID-19**

URGENCES DENTAIRES



prises en charges

aux Cliniques Universitaires St-Luc

Arbre décisionnel

Trois **indications** sont considérées comme **urgentes**:

- Traumatismes
- Abscesses
- Douleurs intenses





Cliniques universitaires
SAINT-LUC
UCL BRUXELLES



 **COVID-19**


URGENCES DENTAIRES

prises en charges
aux Cliniques Universitaires St-Luc

Arbre décisionnel

Trois **indications** sont considérées comme **urgentes**:

- Traumatismes
- Abscès
- Douleurs intenses



Traitements recommandés après **admission et confirmation du diagnostic** (hors trauma):

- Pulpite irréversible: **pulpotomie**
- Parodontite apicale aigue: **pulpectomie** (sauf si accès difficile: prescription antibiotiques et antidouleurs)
- Abcès non-collecté sans réponse aux antibiotiques: **pulpectomie** (sauf si accès difficile: modification du spectre antibiotique)



Cliniques universitaires

SAINT-LUC

UCL BRUXELLES



Un hôpital
pour la Vie

 **COVID-19**

URGENCES DENTAIRES

prises en charges

aux Cliniques Universitaires St-Luc

Précautions en cas d'**admission**

Soins sans aérosol généré

La réalisation d'un diagnostic (examen de bouche et radiographie) ou tout traitement sans aérosol sont des actes à risque faible de transmission

Les précautions dans ce cadre sont:

- L'utilisation d'un masque chirurgical, de lunettes, de gants.
- Faire réaliser au patient un bain de bouche au peroxyde d'hydrogène à 1%
- ! Eviter l'utilisation du spray air-eau car générant un aérosol !
- Désinfecter de manière rigoureuse la salle de soins après la consultation

Soins avec aérosol généré

Les précautions dans ce cadre sont:

- L'utilisation d'un masque FFP2, de lunettes, de gants, d'une surblouse jetable et d'un couvre-chef chirurgical
- Faire réaliser au patient un bain de bouche au peroxyde d'hydrogène à 1%
- Mettre en place une digue dentaire, désinfecter le champs opératoire à l'hypochlorite avant de fraiser
- Utiliser pendant le fraisage une aspiration chirurgicale
- Désinfecter de manière extrêmement rigoureuse et complète la salle de soins après le traitement, et changer de box pour permettre cette désinfection en profondeur
- Compte tenu de l'incertitude de la durée de survie du virus sur les surfaces et dans l'air (au minimum plusieurs heures), nous recommandons de ne pas réutiliser ce box avant min. 24h